

Mini-bula

HENETIX® (iobitridol; 300mg de iodo por mL e 350 mg de iodo por mL). Solução injetável; frasco-ampola de 50 mL, 100 mL ou 500 mL. **Indicações:** para uso em exames de: urografia intravenosa (IV); tomografia computadorizada (TC) de corpo inteiro e cabeça; angiografia por subtração digital por via IV; angiografia periférica e cerebral; angiocardiografia e histerossalpingografia. **CONTRAINDICAÇÕES:** Hipersensibilidade ao iobitridol ou qualquer um dos excipientes. Contraindicação para histerossalpingografia: Gravidez ou em pacientes com neoplasia do trato reprodutivo conhecida ou suspeita (devido ao risco de disseminação peritoneal da neoplasia); histórico de uma reação maior imediata ou reação cutânea tardia a uma injeção de HenetiX®. **tireotoxicose manifesta.** **Advertências e precauções:** risco de reações alérgicas, independentemente da via de administração ou da dose. *Gravidez:* Categoria B: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Metformina; radiofármacos; betabloqueadores, substâncias vasoativas, inibidores da ECA, antagonistas dos receptores de angiotensina; diuréticos; interleucina 2 e outras formas de interação (dosagem in vitro de bilirrubina, proteínas e substâncias inorgânicas (ferro, cobre, cálcio e fosfato). **Reações adversas:** maior frequência: sensação de calor, dor e edema no local de injeção; reações de hipersensibilidade. **Posologia:** Henetix 300®: Doses médias recomendadas para via intravascular: Urografia: injeção IV rápida 1,2 mL/Kg e injeção IV lenta 1,6 mL/Kg; TC crânio 1,4 mL/Kg e TC de corpo inteiro 1,9 mL/Kg; angiografia por subtração digital por via IV 1,7 mL/Kg; angiocardiografia 1,1 mL/Kg; angiografia cerebral 1,8 mL/Kg e angiografia de extremidades inferiores 2,8 mL/Kg. Doses médias recomendadas para via intrauterina: Histerossalpingografia 5 a 20 mL, adaptado ao volume uterino. Henetix 350®: Urografia IV 1,0 mL/Kg; TC de crânio 1,0 mL/Kg; TC de corpo inteiro 1,8 mL/Kg; angiografia por subtração digital por via IV 2,1 mL/Kg; angiocardiografia em adultos 1,9 mL/Kg e angiocardiografia em crianças 4,6 mL/Kg. **USO ADULTO E PEDIÁTRICO. Via intravascular e intrauterina. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO RESTRITO A HOSPITAIS.** Para maiores informações, consulte a bula completa do produto. **Reg. MS – 1.4980.0003.**

Esta mini-bula foi atualizada com base em bula aprovada pela ANVISA em 03/05/2023.